


Avertissements agricoles

BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
RHÔNE-ALPES



Arboriculture

165, rue Garibaldi - Bâtiment B - B.P. 3202 - 69401 LYON Cédex 03

☎ 78.63.25.65

Abonnement annuel : 160,00 Frs - Régisseur Recettes DRAF Rhône-Alpes

Bulletin n° 3 - 12 Février 1990

Psylle du poirier : intensification des pontes**Cloque du pêcher** : maintenez la protection jusqu'à l'étalement des premières feuilles**Puceron vert du pêcher** : dans les vergers fortement infestés en 1989, prévoyez un traitement avant le stade D

PSYLLE DU POIRIER

Une intensification des pontes a été observée ; si vous n'êtes pas encore intervenu, choisissez une journée sans vent pour appliquer les colorants nitrés.

En présence de Cochenilles utilisez le mélange huile de pétrole + DNOC.

CLOQUE DU PECHER

Pour la plupart des variétés de pêches, le stade "pointe verte" des bourgeons à bois terminaux est atteint.

Sur les variétés de nectarines (Flavorgold - Fantasia - Indépendance...) la pointe verte est bien dégagée.

Il est important de maintenir une protection jusqu'à l'étalement des premières feuilles.

A la suite des pluies du 10 et 11 Février, nous vous conseillons de renouveler le traitement avant la fin de cette semaine.

Produits utilisables :

zirame	180 g de ma/hl
thirame	200 g de ma/hl
ferbame	175 g de ma/hl
captane	250 g de ma/hl

nombreuses spécialités
nombreuses spécialités
FERBAMATE
nombreuses spécialités

PUCERON VERT DU PECHER

Les oeufs d'hiver sont éclos et de jeunes pucerons sont visibles sur les rameaux au niveau des bourgeons à fleur.

En 1989 d'importantes attaques ont eu lieu dans de nombreux vergers, aussi prévoyez une application insecticide avant le stade D.

MONILIOSE DE L'ABRICOTIER

Cette maladie peut provoquer des dégâts importants, visibles à la floraison.

Lors de printemps froids et humides, la période de floraison est étalée et de ce fait des attaques sérieuses sont à craindre. La protection doit commencer dès le stade C (bouton rouge) en utilisant du cuivre à la dose de 500 g de cuivre métal/hl. Ce fongicide peut être appliqué jusqu'au stade D, c'est-à-dire avant l'apparition des pétales. Au-delà de ce stade, utilisez des fongicides de synthèse.

Le cuivre présente également une bonne efficacité envers le Corynéum (maladie criblée) et la bactériose.

7668